

- 1.- Dieta completa al llegar a la habitación
- 2.- Hidratación: Dextrosal 0.45% a pasar VEV a 28 gotas por minuto, 500 ml luego omitir. Solo 1 frasco.
- 3.- **Cefazolina:** 1 gramo VEV 60-90 minutos antes de iniciar la cesárea (verificar haya sido cumplido). Dosis unica
- 4.- **Migren:** 1 tableta V0 cada 6 horas, fijo, lo tiene la paciente. Tomarlo antes del Ketorolac
- 5.- **Ketorolac trometamina** 30 mg VSL cada 6 horas, fijo, lo tiene la paciente. Administrar inmediatamente después de tomado el Migren
- 7.- Iniciar deambulacion a las 6 horas de operada, con ayuda de enfermería. No retrasar esta medida a menos que exista una razón de peso o contraindicación válida (avisar al Residente en este caso)
- 8.- Vigilar que haya micción espontánea a las 6 horas de operada y al iniciar deambulacion.
- 9.- Si la paciente es incapaz de orinar voluntariamente a las 6 horas de operada drenar vejiga STAT con sonda de Nelaton; notificar al residente de guardia o enfermería calificada
- 10.- Control de Signos vitales cada 12 horas y anotar
- 11.- Aseo genital BID o a petición de la paciente
- 12.- **No cambiar cura**
- 13.-Esmerarse en dar un trato eficiente, humano y cordial.
- 14.-Respete el sueño, entre a la habitación discretamente.
- 15.-Alta al día siguiente (24hs) salvo se especifique lo contrario

Dr. Ricardo Gómez Betancourt
Obstetra Ginecólogo